
Campaña 2026-27 de Prevención de la Bronquiolitis

INMUNIZACIÓN ANTE VRS: NIRSEVIMAB



VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL



El Virus Respiratorio Sincitial, o VRS, es el agente causal más frecuente de **bronquiolitis** en menores de 2 años.

En la mayoría de los casos, la infección es leve. En ocasiones esta infección requiere de ingreso hospitalario, especialmente en los **menores de 1 año**.








La estacionalidad de este virus ocurre durante los meses de **otoño-invierno**.

NIRSEVIMAB



Nirsevimab es un anticuerpo que bloquea la entrada del VRS a las células que infecta.
Su nombre comercial es *Beyfortus*.

¿CÓMO SE ADMINISTRA?



Se administra de forma **intramuscular** en la cara antero-lateral externa del muslo.

1 DOSIS { Menores de 5 kg: 50 mg
Mayores de 5 kg: 100 mg

Requiere de **consentimiento verbal**

NIÑOS QUE PUEDEN RECIBIR NIRSEVIMAB

Según Campaña de Inmunización de Castilla y León

Niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Prematuros < 35 semanas de edad, antes de cumplir 12 meses de edad.

Niños <24 meses con alto riesgo de enfermedad grave:

- Cardiopatías congénitas
- Cirugía con bypass cardiopulmonar
- Displasia broncopulmonar
- Patologías que suponen gran riesgo de bronquiolitis grave

¿SE PUEDE ADMINISTRAR JUNTO CON OTRAS VACUNAS?

La respuesta es **SÍ**

Se puede administrar junto con vacunas inyectables:

→ En jeringas separadas
→ En diferentes lugares de inyección


También se puede administrar a la vez que la *Vitamina K (Konakion)*



EFECTOS SECUNDARIOS

Los **efectos adversos más frecuentes** son:

- Erupción cutánea (hasta 14 días tras la administración)
- Fiebre
- Reacciones locales en la zona de punción (hinchazón o dolor)



Sin embargo, **NO se han descrito reacciones alérgicas graves** al Nirsevimab

¿DÓNDE ADMINISTRAR NIRSEVIMAB?




Nacidos entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027: HOSPITAL al nacer



Nacidos entre los meses de abril y septiembre anteriores: CENTRO DE VACUNACIÓN HABITUAL

La inmunización de los **prematuros** generalmente se realiza **antes del alta** a domicilio.



Ante cualquier duda, consulta con tu Enfermera Pediátrica o Pediatra.

NOVEDAD

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León amplía en 2026 la vacunación frente al VRS en personas MAYORES 18 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO:

- Cáncer hematológico y no hematológico (en tratamiento activo o últimos 6 meses)
- Inmunodeficiencias primarias
- Infección por VIH avanzada con CD4<200/µl
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos, enfermedad de injerto contra receptor
- Diálisis (peritoneal y hemodiálisis)
- Trasplante de órgano sólido
- Personas institucionalizadas



Esta vacuna no se administra cada año, se deben revisar los antecedentes de vacunación y verificar el estado vacunal antes de su administración.